PROJET DE LA BAIE CHALEUR DE

Belledune

BAIE DES CHALEURS

Annexe DA
Tableaux additionnels pour l'EESC

Février 2005

Environmental & Occupational Hygiene Ltd

GOSS GILROY INC.
Management Consultants
Consultants en gestion

SENES Consultants Limited

Table des matières

Liste des tableaux II
Liste des figures V
Annexe 1 : Population et profils démographiques 1
Annexe 2 : Statistiques de l'état civil 4
Annexe 3 : Incidence du cancer 36
Annexe 4 : Diagnostics-congés des hôpitaux 38

106-02705/

Liste des tableaux

Tableau 1 : État matrimonial, scolarité et revenu selon la zone géographique et l'année de recensement ... 3
Tableau 2 : Nombre de mortinaissances selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001 ... 4
Tableau 3 : Âge moyen de la mère dans le cas de mortinaissances, selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001 ... 4
Tableau 4 : Anomalies congénitales selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001 ... 5
Tableau 5 : Nombre de naissances vivantes selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001 ... 6
Tableau 6 : Âge moyen de la mère dans le cas de naissances vivantes, selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001 ... 6
Tableau 7 : Anomalies congénitales selon année et la zone géographique, de 1989 à 2001 ... 7
Tableau 8 : Âge moyen de la mère à la naissance d'un enfant atteint d'une anomalie congénitale selon la zone géographique, de 1989 à 2001 ... 7
Tableau 9 : Ratio des taux de naissances vivantes dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 8
Tableau 10 : Ratio des taux de décès dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 9
Tableau 11 : Naissances vivantes selon l'âge fœtal et l'année dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 10
Tableau 12 : Ratio des taux de décès chez les nourrissons dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 11
Tableau 13 : Nombre de mortinaissances par année dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 12
Tableau 14 : Anomalies congénitales dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 13
Tableau 15 : Ratio des taux de certaines causes de décès (hommes et femmes) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 14
Tableau 16 : Ratio des taux de certaines causes de décès (hommes) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 15
Tableau 17 : Ratio des taux de certaines causes de décès (femmes) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 16
Tableau 18 : Taux de mortalité proportionnel (GRB), de 1989 à 2001 ... 17
Tableau 19 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) en fonction de certaines causes de décès dans la grande région de Belledune, hommes et femmes combinés, de 1989 à 2001 ... 18
Tableau 20 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) en fonction de certaines causes de décès dans la grande région de Belledune, chez les hommes de 1989 à 2001 ... 19
Tableau 20 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) en fonction de certaines causes de décès dans la grande région de Belledune, chez les hommes de 1989 à 2001 ... 19
Tableau 21 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) en fonction de certaines causes de décès dans la grande région de Belledune, chez les femmes de 1989 à 2001 ... 20
Tableau 22 : Ratio des taux de naissances vivantes dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 ... 21

Tableau 23 : Ratio des taux de décès dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 22
Tableau 24 : Naissances vivantes selon l'âge de la mèreet l'âge fœtal dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 23
Tableau 25 : Poids à la naissance selon l'âge de la mère et poids à la naissance dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 24
Tableau 26 : Ratio des taux de décès chez les nourrissons dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001..... 25
Tableau 27 : Ratio des taux de mortinaissances selon l'année et le sexe dans régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 26
Tableau 28 : Ratio des taux d'anomalies congénitales dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 27
Tableau 29 : Anomalies congénitales dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 28
Tableau 30 : Ratio des taux de certaines causes de décès (hommes et femmes) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 29
Tableau 31 : Ratio des taux de certaines des causes principales de décès (hommes) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 30
Tableau 32 : Ratio des taux de certaines des causes principales de décès (femmes) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001 31
Tableau 33 : Taux de mortalité proportionnel (régions de la santé 5 et 6), de 1989 à 2001 32
Tableau 34 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) par cause de décès dans les régions de la santé 5 et 6, hommes et femmes combinés, de 1989 à 2001 33
Tableau 35 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) par cause de décès dans les régions de la santé 5 et 6, chez les hommes de 1989 à 2001 34
Tableau 36 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) par cause de décès dans les régions de la santé 5 et 6, chez les femmes, de 1989 à 2001 35
Tableau 37 : Ratio d'incidence standardisé (GRB), de 1989 à 2001 36
Tableau 38 : Ratio d'incidence standardisé (RS 5 et 6), de 1989 à 2001 37
Tableau 39 : Nombre total de congés des hôpitaux selon l'exercice financier et la zone géographique, de 1989-1990 à 2001-2002..... 38
Tableau 40 : Nombre total de congés des hôpitaux selon le groupe d'âge et la zone géographique, de 1989-1990 à 2001-2002..... 39
Tableau 41 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil respiratoire (CIM-9 : 460 à 519) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 40
Tableau 42 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil circulatoire (CIM-9 : 390 à 459) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par année, de 1989-1990 à 2001-2002..... 41
Tableau 43 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil digestif (CIM-9 : 520 à 579) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 42

Tableau 44 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil génito-urinaire (CIM-9 : 580 à 629) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 43
Tableau 45 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale un problème endocrinien, nutritionnel ou métabolique (CIM-9 : 240 à 279) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 44
Tableau 46 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de la peau ou des tissus sous-cutanés (CIM-9 : 680 à 709) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick. par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 45
Tableau 47 : Ratio standardisé de morbidité (RSM) dans le cas de certains diagnostics-congés selon le diagnostic principal, dans la grande région de Belledune, de 1989-1990 à 2001-2002 46
Tableau 48 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil respiratoire (CIM-9 : 460 à 519) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 47
Tableau 49 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil circulatoire (CIM-9 : 390 à 459) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 48
Tableau 50 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil digestif (CIM-9 : 520 à 579) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 49
Tableau 51 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil génito-urinaire (CIM-9 : 580 à 629) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 50
Tableau 52 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale un trouble endocrinien, nutritionnel ou métabolique (CIM-9 : 240 à 279) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 51
Tableau 53 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de la peau ou des tissus sous-cutanés (CIM-9 : 680 à 709) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002 52
Tableau 54 : Ratio standardisé de morbidité (RSM) dans le cas de certains diagnostics-congés selon la cause principale, dans les régions de la santé 5 et 6, de 1989-1990 à 2001-2002 53

Liste des figures

Figure 1 : Répartition des groupes d'âge selon le sexe et la zone géographique, 1991 1
Figure 2 : Répartition des groupes d'âge selon le sexe et la zone géographique, 1996 2

Annexe 1 : Population et profils démographiques

Figure 1 : Répartition des groupes d'âge selon le sexe et la zone géographique, 1991



Figure 2 : Répartition des groupes d'âge selon le sexe et la zone géographique, 1996



Tableau 1 : État matrimonial, scolarité et revenu selon la zone géographique et l'année de recensement

Années de recensement/caractéristiques	Zone géographique		
Recensement de 2001	**GRB**	**RS 5 et 6**	**Nouveau-Brunswick**
État matrimonial, célibataire	1 285 (30,96)	33 825 (35,76)	189 335 (31,60)
État matrimonial, marié	2 070 (49,88)	44 250 (46,78)	308 265 (51,46)
État matrimonial, veuf	345 (8,31)	6 795 (7,18)	41 950 (7,00)
État matrimonial, divorcé	220 (5,30)	4 885 (5,16)	37 070 (6,19)
État matrimonial, séparé	230 (5,54)	4 835 (5,11)	22 465 (3,75)
Scolarité, moins d'une neuvième année	960 (23,88)	20 455 (22,97)	79 850 (13,89)
Scolarité, 9e à 13e année, sans diplôme, certificat ou grade	770 (19,15)	17 585 (19,75)	103 750 (18,05)
Scolarité, 9e à 13e année, avec diplôme, certificat ou grade	1 140 (28,36)	21 110 (23,71)	146 445 (25,48)
Scolarité, non universitaire, sans diplôme, certificat ou grade	110 (2,74)	3 200 (3,59)	23 665 (4,12)
Scolarité, non universitaire, avec diplôme, certificat ou grade	560 (13,93)	10 790 (12,12)	80 830 (14,06)
Scolarité, universitaire sans diplôme, certificat ou grade	255 (6,34)	6 985 (7,85)	62 795 (10,93)
Scolarité, universitaire avec diplôme, certificat ou grade	225 (5,60)	8 910 (10,01)	77 435 (13,47)
Taux d'emploi exprimé en pourcentage de la population de 25 ans et plus	83,07 %	82,89 %	87,50 %
Moyenne du revenu personnel	42 821,14 $	42 377,62 $	47 587,17 $
Recensement de 1996	**GRB**	**RS 5 et 6**	**Nouveau-Brunswick**
État matrimonial, célibataire	1 440 (33,18)	34 870 (35,83)	185 335 (31,27)
État matrimonial, marié	2 160 (49,77)	47 080 (48,37)	313 165 (52,83)
État matrimonial, veuf	320 (7,37)	6 510 (6,69)	40 830 (6,89)
État matrimonial, divorcé	210 (4,84)	4 435 (4,56)	32 705 (5,52)
État matrimonial, séparé	210 (4,84)	4 435 (4,56)	20 730 (3,50)
Scolarité, moins d'une neuvième année	1 115 (24,34)	23 995 (23,35)	95 660 (15,01)
Scolarité, 9e à 13e année, sans diplôme, certificat ou grade	1 170 (25,55)	23 935 (23,29)	139 285 (21,86)
Scolarité, 9e à 13e année, avec diplôme, certificat ou grade	620 (13,54)	14 775 (14,38)	104 020 (16,32)
Scolarité, non universitaire, sans diplôme, certificat ou grade	135 (2,95)	3 725 (3,62)	24 365 (3,82)
Scolarité, non universitaire, avec diplôme, certificat ou grade	745 (16,27)	14 265 (13,88)	100 530 (15,78)
Scolarité, universitaire sans diplôme, certificat ou grade	425 (9,28)	11 235 (10,93)	87 285 (13,70)
Scolarité, universitaire avec diplôme, certificat ou grade	370 (8,08)	10 850 (10,56)	86 090 (13,51)
Taux d'emploi exprimé en pourcentage de la population de 25 ans et plus	80,13 %	78,41 %	84,69 %
Moyenne du revenu personnel	18 872,47 $	18 709,20 $	20 799,18 $
Recensement de 1991	**GRB**	**RS 5 et 6**	**Nouveau-Brunswick**
État matrimonial, célibataire	1 445 (32,04)	32 345 (34,01)	171 530 (30,00)
État matrimonial, marié	2 470 (54,77)	49 900 (52,46)	318 530 (55,71)
État matrimonial, veuf	285 (6,32)	5 990 (6,30)	38 780 (6,78)
État matrimonial, divorcé	125 (2,77)	3 210 (3,37)	25 900 (4,53)
État matrimonial, séparé	185 (4,10)	3 670 (3,86)	17 070 (2,99)
Scolarité, moins d'une neuvième année	1 200 (25,26)	26 420 (26,39)	109 800 (17,87)
Scolarité, 9e à 13e année, sans diplôme, certificat ou grade	1 460 (30,74)	25 535 (25,51)	145 935 (23,75)
Scolarité, 9e à 13e année, avec diplôme, certificat ou grade	645 (13,58)	13 305 (13,29)	97 160 (15,81)
Scolarité, non universitaire, sans diplôme, certificat ou grade	170 (3,58)	3 300 (3,30)	24 080 (3,92)
Scolarité, non universitaire, avec diplôme, certificat ou grade	510 (10,74)	12 475 (12,46)	84 510 (13,75)
Scolarité, universitaire sans diplôme, certificat ou grade	425 (8,95)	10 315 (10,31)	82 150 (13,37)
Scolarité, universitaire avec diplôme, certificat ou grade	340 (7,16)	8 745 (8,74)	70 945 (11,54)
Taux d'emploi exprimé en pourcentage de la population de 25 ans et plus	79,64 %	80,45 %	86,26 %
Moyenne du revenu personnel	30 999,02 $	34 988,09 $	38 971,62 $

Annexe 2 : Statistiques de l'état civil

Tableau 2 : Nombre de mort naissances selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001

Âge de la mère	Grande région de Belledune	Régions de la santé 5 et 6	Nouveau-Brunswick
1989	0	13	57
1990	0	9	66
1991	0	12	57
1992	0	11	53
1993	0	7	49
1994	0	**	59
1995	0	**	32
1996	**	**	42
1997	0	9	47
1998	0	**	39
1999	0	**	52
2000	0	**	38
2001	0	**	41
Total	**	91	632

Remarque : **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 3 : Âge moyen de la mère dans le cas de mortinaissances, selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune (écart-type)	Régions de la santé 5 et 6 (écart-type)	Nouveau-Brunswick (écart-type)
1989	0,00 (0,00)	26,00 (7,16)	26,70 (5,97)
1990	0,00 (0,00)	31,78 (7,50)	26,42 (6,06)
1991	0,00 (0,00)	24,33 (6,67)	25,79 (5,69)
1992	0,00 (0,00)	28,36 (6,28)	26,60 (5,20)
1993	0,00 (0,00)	27,71 (6,58)	27,24 (6,29)
1994	0,00 (0,00)	21,20 (5,97)	26,83 (5,58)
1995	0,00 (0,00)	33,00 (0,00)	27,34 (5,78)
1996	**	28,20 (6,50)	27,17 (6,22)
1997	0,00 (0,00)	27,56 (4,16)	26,40 (4,85)
1998	0,00 (0,00)	29,60 (6,54)	26,41 (5,47)
1999	0,00 (0,00)	26,20 (6,42)	28,00 (6,12)
2000	0,00 (0,00)	29,75 (2,50)	27,66 (5,87)
2001	0,00 (0,00)	25,60 (3,29)	27,39 (5,64)
Moyenne globale	**	27,21 (6,39)	26,87 (5,75)

Remarque : **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 4 : Anomalies congénitales selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune	Régions de la santé 5 et 6	Nouveau-Brunswick
1989	0	8	51
1990	0	**	28
1991	0	7	41
1992	0	7	48
1993	**	**	60
1994	**	12	42
1995	0	**	41
1996	0	6	40
1997	0	**	29
1998	0	**	19
1999	**	**	18
2000	0	**	19
2001	0	0	14
Total	**	62	450

Remarque : **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 5 : Nombre de naissances vivantes selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune	Régions de la santé 5 et 6	Nouveau-Brunswick
1989	84	1 485	9 651
1990	99	1 524	9 818
1991	85	1 451	9 493
1992	88	1 400	9 385
1993	82	1 293	9 041
1994	78	1 297	8 965
1995	75	1 203	8 556
1996	52	1 044	8 172
1997	64	1 162	7 907
1998	53	1 054	7 868
1999	48	979	7 605
2000	49	982	7 340
2001	40	905	7 141
Total	897	15 779	110 942

Tableau 6 : Âge moyen de la mère dans le cas de naissances vivantes, selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune (écart-type)	Régions de la santé 5 et 6 (écart-type)	Nouveau-Brunswick (écart-type)
1989	25,51 (4,21)	26,03 (4,86)	26,07 (4,90)
1990	26,09 (4,42)	26,03 (4,78)	26,24 (4,95)
1991	26,02 (4,72)	26,14 (4,81)	26,27 (5,00)
1992	25,27 (4,82)	26,04 (5,10)	26,46 (5,20)
1993	27,11 (4,61)	26,20 (5,08)	26,59 (5,23)
1994	26,32 (5,08)	26,40 (5,06)	26,59 (5,21)
1995	25,45 (4,71)	26,29 (5,09)	26,69 (5,34)
1996	26,37 (5,10)	26,62 (5,24)	26,98 (5,36)
1997	25,69 (4,25)	26,57 (5,03)	26,93 (5,28)
1998	26,83 (4,75)	26,61 (5,41)	27,12 (5,41)
1999	26,17 (4,36)	26,90 (5,27)	27,21 (5,34)
2000	26,82 (5,37)	26,86 (5,21)	27,27 (5,36)
2001	27,33 (5,72)	27,07 (5,23)	27,43 (5,37)
Total	26,14 (4,74)	26,39 (5,08)	26,72 (5,23)

Tableau 7 : Anomalies congénitales selon l'année et la zone géographique, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune	Régions de la santé 5 et 6	Nouveau-Brunswick
1989	0	8	51
1990	0	**	28
1991	0	7	41
1992	0	7	48
1993	**	**	60
1994	**	12	42
1995	0	**	41
1996	0	6	40
1997	0	**	29
1998	0	**	19
1999	**	**	18
2000	0	**	19
2001	0	0	14
Total	**	62	450

Remarque : **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 8 : Âge moyen de la mère à la naissance d'un enfant atteint d'une anomalie congénitale selon la zone géographique, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune (écart-type)	Régions de la santé 5 et 6 (écart-type)	Nouveau-Brunswick (écart-type)
1989	0,00 (0,00)	27,13 (7,66)	26,59 (5,44)
1990	0,00 (0,00)	24,75 (2,99)	26,50 (4,53)
1991	0,00 (0,00)	23,71 (3,45)	25,37 (4,84)
1992	0,00 (0,00)	24,71 (5,19)	27,42 (5,81)
1993	**	21,75 (3,20)	26,58 (5,79)
1994	**	27,42 (5,74)	27,02 (5,33)
1995	0,00 (0,00)	24,25 (4,72)	27,90 (4,40)
1996	0,00 (0,00)	25,17 (5,38)	26,30 (5,64)
1997	0,00 (0,00)	26,00 (8,51)	26,07 (5,87)
1998	0,00 (0,00)	26,00 (0,00)	25,42 (4,29)
1999	**	28,33 (6,43)	26,67 (6,34)
2000	0,00 (0,00)	25,00 (0,00)	27,63 (4,63)
2001	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	28,43 (4,65)
Moyenne globale	29,20 (8,04)	25,56 (5,48)	26,72 (5,30)

Remarque : **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 9 : Ratio des taux de naissances vivantes dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Nombre	Taux*	Population	Nombre	Taux*				
1989	4 668	84	17,99	614 522	8 166	13,29	1,35	1,06	1,65	<0,01
1990	4 645	99	21,31	619 189	8 294	13,39	1,59	1,28	1,91	<0,01
1991	5 400	85	15,74	621 484	8 042	12,94	1,22	0,96	1,48	0,08
1992	5 405	88	16,28	624 420	7 985	12,79	1,27	1,01	1,54	0,03
1993	5 401	82	15,18	625 577	7 748	12,39	1,23	0,96	1,49	0,07
1994	5 381	78	14,50	627 539	7 668	12,22	1,19	0,92	1,45	0,15
1995	5 356	75	14,00	629 006	7 353	11,69	1,20	0,93	1,47	0,13
1996	5 338	52	9,74	630 777	7 128	11,30	0,86	0,63	1,10	0,28
1997	5 328	64	12,01	632 355	6 745	10,67	1,13	0,85	1,40	0,38
1998	5 288	53	10,02	632 498	6 814	10,77	0,93	0,68	1,18	0,60
1999	5 250	48	9,14	634 432	6 626	10,44	0,88	0,63	1,12	0,36
2000	5 226	49	9,38	637 312	6 358	9,98	0,94	0,68	1,20	0,67
2001	4 935	40	8,11	615 105	6 236	10,14	0,80	0,55	1,05	0,16
Total	67 621	897	13,27	8 144 216	95 163	11,68	1,14	1,06	1,21	<0,01

Remarque : *Les taux affichés pour les naissances sont des taux bruts par tranche de 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 10 : Ratio des taux de décès dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Nombre	Taux*	Population	Nombre	Taux*				
1989	4 668	42	9,00	614 522	4 757	7,74	1,16	0,81	1,52	0,37
1990	4 645	53	11,41	619 189	4 666	7,54	1,51	1,10	1,92	<0,01
1991	5 400	49	9,07	621 484	4 752	7,65	1,19	0,85	1,52	0,26
1992	5 405	54	9,99	624 420	4 858	7,78	1,28	0,94	1,63	0,08
1993	5 401	50	9,26	625 577	4 965	7,94	1,17	0,84	1,49	0,31
1994	5 381	56	10,41	627 539	5 024	8,01	1,30	0,96	1,64	0,06
1995	5 356	39	7,28	629 006	5 105	8,12	0,90	0,61	1,18	0,50
1996	5 338	61	11,43	630 777	5 000	7,93	1,44	1,08	1,81	<0,01
1997	5 328	48	9,01	632 355	5 088	8,05	1,12	0,80	1,44	0,48
1998	5 288	54	10,21	632 498	5 365	8,48	1,20	0,88	1,53	0,20
1999	5 250	46	8,76	634 432	5 123	8,07	1,09	0,77	1,40	0,63
2000	5 226	33	6,31	637 312	5 182	8,13	0,78	0,51	1,04	0,16
2001	4 935	47	9,52	615 105	5 039	8,19	1,16	0,83	1,50	0,34
Total	67 621	632	9,35	8 144 216	64 924	7,97	1,17	1,08	1,26	<0,01

Remarque : *Les taux affichés pour les décès sont des taux bruts par tranche de 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 11 : Naissances vivantes selon l'âge fœtal et l'année dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune					Population-type du Nouveau-Brunswick				
	Âge fœtal (en semaines)				Total	Âge fœtal (en semaines)				Total
	<27 (%)	28-36 (%)	37-41 (%)	42+ (%)		<27 (%)	28-36 (%)	37-41 (%)	42+ (%)	
1989	0 (0,00)	**	77 (9,24)	**	84 (9,36)	42 (11,97)	548 (9,08)	7 193 (8,44)	383 (10,64)	8 166 (8,58)
1990	0 (0,00)	**	94 (11,28)	**	99 (11,04)	33 (9,40)	487 (8,07)	7 331 (8,61)	443 (12,31)	8 294 (8,72)
1991	0 (0,00)	**	80 (9,60)	**	85 (9,48)	29 (8,26)	534 (8,85)	7 051 (8,28)	428 (11,89)	8 042 (8,45)
1992	0 (0,00)	**	83 (9,96)	**	88 (9,81)	31 (8,83)	495 (8,20)	7 087 (8,32)	372 (10,34)	7 985 (8,39)
1993	0 (0,00)	**	76 (9,12)	**	82 (9,14)	27 (7,69)	520 (8,61)	6 799 (7,98)	402 (11,17)	7 748 (8,14)
1994	0 (0,00)	**	74 (8,88)	**	78 (8,70)	22 (6,27)	546 (9,04)	6 771 (7,95)	329 (9,14)	7 668 (8,06)
1995	0 (0,00)	**	70 (8,40)	**	75 (8,36)	15 (4,27)	426 (7,06)	6 601 (7,75)	311 (8,64)	7 353 (7,73)
1996	**	**	47 (5,64)	**	52 (5,80)	20 (5,70)	443 (7,34)	6 421 (7,54)	244 (6,78)	7 128 (7,49)
1997	0 (0,00)	**	59 (7,08)	**	64 (7,13)	24 (6,84)	384 (6,36)	6 148 (7,22)	189 (5,25)	6 745 (7,09)
1998	0 (0,00)	**	50 (6,00)	**	53 (5,91)	40 (11,40)	393 (6,51)	6 210 (7,29)	171 (4,75)	6 814 (7,16)
1999	0 (0,00)	**	43 (5,16)	**	48 (5,35)	24 (6,84)	444 (7,35)	6 020 (7,07)	138 (3,83)	6 626 (6,96)
2000	0 (0,00)	**	44 (5,28)	**	49 (5,46)	16 (4,56)	391 (6,48)	5 862 (6,88)	89 (2,47)	6 358 (6,68)
2001	0 (0,00)	**	36 (4,32)	**	40 (4,46)	28 (7,98)	426 (7,06)	5 682 (6,67)	100 (2,78)	6 236 (6,55)
Total	**	46 (100,00)	833 (100,00)	17 (100,00)	897 (100,00)	351 (100,00)	6 037 (100,00)	85 176 (100,00)	3 599 (100,00)	95 163 (100,00)

Remarque : **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 12 : Ratio des taux de décès chez les nourrissons dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Nombre de naissances	Décès de nourrisson (de 0 à 364 jours)		Nombre de naissances	Décès de nourrisson (de 0 à 364 jours)					
		N	Taux*		N	Taux*				
1989	84 (9,36)	0 (0,00)	0,00	8 166 (8,58)	61 (10,87)	7,47	-	-	-	-
1990	99 (11,04)	**	**	8 294 (8,72)	59 (10,52)	7,11	**	**	**	**
1991	85 (9,48)	0 (0,00)	0,00	8 042 (8,45)	52 (9,27)	6,47	-	-	-	-
1992	88 (9,81)	0 (0,00)	0,00	7 985 (8,39)	55 (9,80)	6,89	-	-	-	-
1993	82 (9,14)	0 (0,00)	0,00	7 748 (8,14)	62 (11,05)	8,00	-	-	-	-
1994	78 (8,70)	0 (0,00)	0,00	7 668 (8,06)	40 (7,13)	5,22	-	-	-	-
1995	75 (8,36)	0 (0,00)	0,00	7 353 (7,73)	38 (6,77)	5,17	-	-	-	-
1996	52 (5,80)	0 (0,00)	0,00	7 128 (7,49)	34 (6,06)	4,77	-	-	-	-
1997	64 (7,13)	**	**	6 745 (7,09)	38 (6,77)	5,63	**	**	**	**
1998	53 (5,91)	0 (0,00)	0,00	6 814 (7,16)	45 (8,02)	6,60	-	-	-	-
1999	48 (5,35)	0 (0,00)	0,00	6 626 (6,96)	33 (5,88)	4,98	-	-	-	-
2000	49 (5,46)	0 (0,00)	0,00	6 358 (6,68)	21 (3,74)	3,30	-	-	-	-
2001	40 (4,46)	0 (0,00)	0,00	6 236 (6,55)	23 (4,10)	3,69	-	-	-	-
Total	897 (100,00)	**	**	95 163 (100,00)	561 (100,00)	5,90	0,57	0,00	1,21	0,33

Remarque : *Les taux affichés pour les décès de nourrisson sont des taux bruts par tranche de 1000 naissances. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.
**Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 13 : Nombre de mortinaissances par année dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Total des naissances	Mortinaissances	Taux	Total des naissances	Mortinaissances	Taux				
1989	84 (9,36)	0 (0,00)	0,00	8 166 (8,58)	44 (8,13)	5,39	-	-	-	-
1990	99 (11,04)	0 (0,00)	0,00	8 294 (8,72)	57 (10,54)	6,87	-	-	-	-
1991	85 (9,48)	0 (0,00)	0,00	8 042 (8,45)	45 (8,32)	5,60	-	-	-	-
1992	88 (9,81)	0 (0,00)	0,00	7 985 (8,39)	42 (7,76)	5,26	-	-	-	-
1993	82 (9,14)	0 (0,00)	0,00	7 748 (8,14)	42 (7,76)	5,42	-	-	-	-
1994	78 (8,70)	0 (0,00)	0,00	7 668 (8,06)	54 (9,98)	7,04	-	-	-	-
1995	75 (8,36)	0 (0,00)	0,00	7 353 (7,73)	31 (5,73)	4,22	-	-	-	-
1996	52 (5,80)	**	**	7 128 (7,49)	37 (6,84)	5,19	**	**	**	-
1997	64 (7,13)	0 (0,00)	0,00	6 745 (7,09)	38 (7,02)	5,63	-	-	-	-
1998	53 (5,91)	0 (0,00)	0,00	6 814 (7,16)	34 (6,28)	4,99	-	-	-	-
1999	48 (5,35)	0 (0,00)	0,00	6 626 (6,96)	47 (8,69)	7,09	-	-	-	-
2000	49 (5,46)	0 (0,00)	0,00	6 358 (6,68)	34 (6,28)	5,35	-	-	-	-
2001	40 (4,46)	0 (0,00)	0,00	6 236 (6,55)	36 (6,65)	5,77	-	-	-	-
Total	897 (100,00)	**	**	95 163 (100,00)	541 (100,00)	5,68	0,20	0,00	0,58	-

Remarque : *Les taux affichés pour les mortinaissances sont des taux bruts par tranche de 1000 naissances. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.
**Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 14 : Anomalies congénitales dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Anomalies congénitales (CIM-9)	GRB		Population-type du N.-B.		Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	N (%)	Taux	N (%)	Taux				
Toutes les anomalies congénitales (740 à 759)	**	**	388 (100,00)	4,08	1,37	0,16	2,57	-
Défauts du système nerveux (740 à 742)	**	**	47 (12,11)	0,49	2,26	0,00	6,73	-
Anomalies oculaires (743)	0 (0,00)	0,00	3 (0,77)	0,03	-	-	-	-
Anomalies aux oreilles, au visage ou au cou (744)	0 (0,00)	0,00	15 (3,87)	0,16	-	-	-	-
Anomalies cardiaques (745 et 746)	0 (0,00)	0,00	29 (7,47)	0,30	-	-	-	-
Anomalies de l'appareil circulatoire (747)	0 (0,00)	0,00	3 (0,77)	0,03	-	-	-	-
Anomalies de l'appareil respiratoire (748)	0 (0,00)	0,00	4 (1,03)	0,04	-	-	-	-
Fente palatine/bec-de-lièvre (749)	0 (0,00)	0,00	35 (9,02)	0,37	-	-	-	-
Anomalies du tube digestif supérieur (750)	0 (0,00)	0,00	5 (1,29)	0,05	-	-	-	-
Autres anomalies de l'appareil digestif (751)	0 (0,00)	0,00	12 (3,09)	0,13	-	-	-	-
Anomalies des organes génitaux (752)	0 (0,00)	0,00	38 (9,79)	0,40	-	-	-	-
Anomalies de l'appareil urinaire (753)	0 (0,00)	0,00	11 (2,84)	0,12	-	-	-	-
Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (754 et 756)	**	**	126 (32,47)	1,32	**	**	**	-
Anomalies du tégument (757)	**	**	14 (3,61)	0,15	**	**	**	-
Anomalies chromosomiques (758)	**	**	25 (6,44)	0,26	**	**	**	-
Anomalies multiples (759)	0 (0,00)	0,00	21 (5,41)	0,22	-	-	-	-

Remarque : *Les taux affichés pour les anomalies congénitales sont des taux bruts par tranche de 1000 naissances. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.
**Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 15 : Ratio des taux de certaines causes de décès (hommes et femmes) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	GRB		Population-type du N.-B.		Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	N (%)	Taux*	N (%)	Taux*				
Néoplasmes (140 à 208)	217 (34,34)	3,21	17 389 (26,78)	2,14	1,50	1,30	1,70	<0,01
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	21 (3,32)	0,31	2 265 (3,49)	0,28	1,12	0,64	1,60	0,70
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	16 (2,53)	0,24	2 184 (3,36)	0,27	0,88	0,45	1,32	0,62
Appareil circulatoire (390 à 459)	226 (35,76)	3,34	25 510 (39,29)	3,13	1,07	0,93	1,21	0,35
Appareil respiratoire (460 à 519)	44 (6,96)	0,65	5 585 (8,60)	0,69	0,95	0,67	1,23	0,73
Appareil digestif (520 à 579)	22 (3,48)	0,33	2 223 (3,42)	0,27	1,19	0,69	1,69	0,48
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	9 (1,42)	0,13	1 156 (1,78)	0,14	0,94	0,32	1,55	0,92
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	0 (0,00)	0,00	59 (0,09)	0,01	-	-	-	-
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	**	**	331 (0,51)	0,04	**	**	**	-
Anomalies congénitales (740 à 759)	**	**	324 (0,50)	0,04	**	**	**	-
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	0 (0,00)	0,00	234 (0,36)	0,03	-	-	-	-
Autres causes	70 (11,08)	1,04	7 664 (11,80)	0,94	1,10	0,84	1,36	0,46
Toutes les causes	632 (100,00)	9,35	64 924 (100,00)	7,97	1,17	1,08	1,26	<0,01

Remarque : *Les taux affichés sont des taux bruts par tranche de 100 000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 16 : Ratio des taux de certaines causes de décès (hommes) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	GRB		Population-type du N.-B.		Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	N (%)	Taux*	N (%)	Taux*				
Néoplasmes (140 à 208)	138 (35,48)	4,09	9 582 (27,97)	2,38	1,72	1,43	2,01	<0,01
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	10 (2,57)	0,30	1 072 (3,13)	0,27	1,11	0,42	1,81	0,86
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	8 (2,06)	0,24	957 (2,79)	0,24	1,00	0,30	1,69	1,00
Appareil circulatoire (390 à 459)	133 (34,19)	3,94	12 984 (37,90)	3,22	1,22	1,01	1,43	0,02
Appareil respiratoire (460 à 519)	24 (6,17)	0,71	3 097 (9,04)	0,77	0,92	0,55	1,30	0,71
Appareil digestif (520 à 579)	16 (4,11)	0,47	1 124 (3,28)	0,28	1,70	0,86	2,54	0,05
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	**	**	594 (1,73)	0,15	**	**	**	**
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	0 (0,00)	0,00	24 (0,07)	0,01	-	-	-	-
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	0 (0,00)	0,00	107 (0,31)	0,03	-	-	-	-
Anomalies congénitales (740 à 759)	**	**	169 (0,49)	0,04	**	**	**	**
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	0 (0,00)	0,00	132 (0,39)	0,03	-	-	-	-
Autres causes	55 (14,14)	1,63	4 419 (12,90)	1,10	1,49	1,09	1,88	<0,01
Toutes les causes	389 (100,00)	11,52	34 261 (100,00)	8,50	1,36	1,22	1,49	<0,01

Remarque : *Les taux affichés sont des taux bruts par tranche de 100 000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures. **Données supprimées en raison du faible nombre ($n \leq 5$).

Tableau 17 : Ratio des taux de certaines causes de décès (femmes) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	GRB		Population-type du N.-B.		Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	N (%)	Taux*	N (%)	Taux*				
Néoplasmes (140 à 208)	79 (32,51)	2,33	7 807 (25,46)	1,90	1,23	0,96	1,50	0,08
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	11 (4,53)	0,32	1 193 (3,89)	0,29	1,12	0,46	1,79	0,82
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	8 (3,29)	0,24	1 227 (4,00)	0,30	0,79	0,24	1,34	0,52
Appareil circulatoire (390 à 459)	93 (38,27)	2,75	12 526 (40,85)	3,04	0,90	0,72	1,09	0,32
Appareil respiratoire (460 à 519)	20 (8,23)	0,59	2 488 (8,11)	0,60	0,98	0,55	1,41	0,99
Appareil digestif (520 à 579)	6 (2,47)	0,18	1 099 (3,58)	0,27	0,66	0,13	1,20	0,32
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	7 (2,88)	0,21	562 (1,83)	0,14	1,51	0,39	2,64	0,39
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	0 (0,00)	0,00	35 (0,11)	0,01	-	-	-	-
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	**	**	224 (0,73)	0,05	**	**	**	-
Anomalies congénitales (740 à 759)	**	**	155 (0,51)	0,04	**	**	**	-
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	0 (0,00)	0,00	102 (0,33)	0,02	-	-	-	-
Autres causes	15 (6,17)	0,44	3 245 (10,58)	0,79	0,56	0,28	0,85	0,02
Toutes les causes	243 (100,00)	7,18	30 663 (100,00)	7,45	0,96	0,84	1,08	0,56

Remarque : *Les taux affichés sont des taux bruts par tranche de 100 000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 18 : Taux de mortalité proportionnel (GRB), de 1989 à 2001

Cause de décès	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	N	TMP*	Valeur *p*	N	TMP*	Valeur *p*	N	TMP*	Valeur *p*
Néoplasmes (140 à 208)	217	1,28	<0,05	138	1,27	<0,05	79	1,28	<0,05
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	21	0,95	0,82	10	0,82	0,51	11	1,16	0,62
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	16	0,75	0,25	8	0,74	0,38	8	0,82	0,58
Appareil circulatoire (390 à 459)	226	0,91	0,16	133	0,90	0,23	93	0,94	0,53
Appareil respiratoire (460 à 519)	44	0,81	0,15	24	0,68	0,06	20	1,01	0,95
Appareil digestif (520 à 579)	22	1,02	0,94	16	1,25	0,37	6	0,69	0,36
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	9	0,80	0,50	**	**	**	**	**	**
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Anomalies congénitales (740 à 759)	**	**	**	**	**	**	**	**	**
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Autres causes	70	0,94	0,59	55	1,10	0,50	15	0,58	<0,05
Toutes les causes	632	-	-	389	-	-	243	-	-

Remarque : *TMP – taux de mortalité proportionnel brut. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 19 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) en fonction de certaines causes de décès dans la grande région de Belledune (GRB), hommes et femmes combinés, de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	Observé	Prévu	RSM	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
Néoplasmes (140 à 208)	217	141,39	1,53	1,33	1,74	<0,01
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	21	17,69	1,19	0,68	1,69	0,43
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	16	16,44	0,97	0,50	1,45	0,91
Appareil circulatoire (390 à 459)	226	194,04	1,16	1,01	1,32	0,02
Appareil respiratoire (460 à 519)	44	42,10	1,05	0,74	1,35	0,76
Appareil digestif (520 à 579)	22	17,30	1,27	0,74	1,80	0,26
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	9	8,64	1,04	0,36	1,72	0,92
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	0	0,42	0,00	-	-	-
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	**	2,55	0,78	**	**	-
Anomalies congénitales (740 à 759)	**	2,46	2,03	**	**	-
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	0	1,67	0,00	-	-	-
Autres causes	70	59,76	1,17	0,90	1,45	0,19
Toutes les causes	632	504,51	1,25	1,16	1,35	<0,01

Remarque : LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 20 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) en fonction de certaines causes de décès dans la grande région de Belledune (GRB), chez les hommes de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	Observé	Prévu	RSM	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
Néoplasmes (140 à 208)	138	81,01	1,70	1,42	1,99	<0,01
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	10	8,81	1,14	0,43	1,84	0,69
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	8	7,62	1,05	0,32	1,78	0,89
Appareil circulatoire (390 à 459)	133	105,21	1,26	1,05	1,48	<0,01
Appareil respiratoire (460 à 519)	24	24,28	0,99	0,59	1,38	0,95
Appareil digestif (520 à 579)	16	9,30	1,72	0,88	2,56	0,03
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	**	**	0,43	**	**	**
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	0	0,19	0,00	-	-	-
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	0	0,88	0,00	-	-	-
Anomalies congénitales (740 à 759)	**	**	2,40	**	**	**
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	0	0,89	0,00	-	-	-
Autres causes	55	36,23	1,52	1,12	1,92	<0,01
Toutes les causes	389	280,29	1,39	1,25	1,53	<0,01

Remarque : LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 21 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) en fonction de certaines causes de décès dans la grande région de Belledune (GRB), chez les femmes de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	Observé	Prévu	RSM	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
Néoplasmes (140 à 208)	79	61,54	1,28	1,00	1,57	0,03
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	11	8,95	1,23	0,50	1,96	0,49
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	8	8,89	0,90	0,28	1,52	0,76
Appareil circulatoire (390 à 459)	93	90,43	1,03	0,82	1,24	0,79
Appareil respiratoire (460 à 519)	20	18,16	1,10	0,62	1,58	0,66
Appareil digestif (520 à 579)	6	8,11	0,74	0,15	1,33	0,46
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	7	4,07	1,72	0,45	2,99	0,15
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	0	0,26	0,00	-	-	-
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	**	1,67	1,20	**	**	**
Anomalies congénitales (740 à 759)	**	1,20	1,66	**	**	**
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	0	0,77	0,00	-	-	-
Autres causes	15	23,86	0,63	0,31	0,95	0,07
Toutes les causes	243	227,91	1,07	0,93	1,20	0,32

Remarque : LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5)

Tableau 22 : Ratio des taux de naissances vivantes dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Nombre	Taux*	Population	Nombre	Taux*				
1989	123 472	1 485	12,03	614 522	8 166	13,29	0,91	0,86	0,96	<0,001
1990	123 766	1 524	12,31	619 189	8 294	13,39	0,92	0,87	0,97	0,002
1991	124 062	1 451	11,70	621 484	8 042	12,94	0,90	0,85	0,95	<0,001
1992	124 043	1 400	11,29	624 420	7 985	12,79	0,88	0,83	0,93	<0,001
1993	123 953	1 293	10,43	625 577	7 748	12,39	0,84	0,79	0,89	<0,001
1994	123 403	1 297	10,51	627 539	7 668	12,22	0,86	0,81	0,91	<0,001
1995	122 776	1 203	9,80	629 006	7 353	11,69	0,84	0,79	0,89	<0,001
1996	122 218	1 044	8,54	630 777	7 128	11,30	0,76	0,71	0,81	<0,001
1997	121 882	1 162	9,53	632 355	6 745	10,67	0,89	0,84	0,95	<0,001
1998	120 923	1 054	8,72	632 498	6 814	10,77	0,81	0,76	0,86	<0,001
1999	119 916	979	8,16	634 432	6 626	10,44	0,78	0,73	0,83	<0,001
2000	119 286	982	8,23	637 312	6 358	9,98	0,83	0,77	0,88	<0,001
2001	112 530	905	8,04	615 105	6 236	10,14	0,79	0,74	0,85	<0,001
Total	1 582 230	15 779	9,97	8 144 216	95 163	11,68	0,85	0,84	0,87	<0,001

Remarque : *Les taux affichés pour les naissances sont des taux bruts par tranche de 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 23 : Ratio des taux de décès dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Nombre	Taux*	Population	Nombre	Taux*				
1989	123 472	796	6,45	614 522	4 757	7,74	0,83	0,77	0,90	<0,001
1990	123 766	847	6,84	619 189	4 666	7,54	0,91	0,84	0,97	0,009
1991	124 062	841	6,78	621 484	4 752	7,65	0,89	0,82	0,95	0,001
1992	124 043	841	6,78	624 420	4 858	7,78	0,87	0,81	0,94	<0,001
1993	123 953	854	6,89	625 577	4 965	7,94	0,87	0,81	0,93	<0,001
1994	123 403	901	7,30	627 539	5 024	8,01	0,91	0,85	0,98	0,01
1995	122 776	836	6,81	629 006	5 105	8,12	0,84	0,78	0,90	<0,001
1996	122 218	902	7,38	630 777	5 000	7,93	0,93	0,87	1,00	0,05
1997	121 882	862	7,07	632 355	5 088	8,05	0,88	0,82	0,94	<0,001
1998	120 923	945	7,81	632 498	5 365	8,48	0,92	0,86	0,99	0,02
1999	119 916	957	7,98	634 432	5 123	8,07	0,99	0,92	1,06	0,73
2000	119 286	912	7,65	637 312	5 182	8,13	0,94	0,87	1,01	0,07
2001	112 530	951	8,45	615 105	5 039	8,19	1,03	0,96	1,10	0,39
Total	1 582 230	11 445	7,23	8 144 216	64 924	7,97	0,91	0,89	0,93	<0,001

*Les taux affichés pour les décès sont des taux bruts par tranche de 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 24 : Naissances vivantes selon l'âge de la mère et l'âge fœtal dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Régions de la santé 5 et 6					Population-type du Nouveau-Brunswick				
	Âge fœtal (en semaines)				Total	Âge fœtal (en semaines)				Total
	<27 (%)	28-36 (%)	37-41 (%)	42+ (%)		<27 (%)	28-36 (%)	37-41 (%)	42+ (%)	
1989	**	80 (8,49)	1 329 (9,26)	74 (16,63)	1 485 (9,41)	42 (11,97)	548 (9,08)	7 193 (8,44)	383 (10,64)	8 166 (8,58)
1990	**	75 (7,96)	1 372 (9,56)	74 (16,63)	1 524 (9,66)	33 (9,40)	487 (8,07)	7 331 (8,61)	443 (12,31)	8 294 (8,72)
1991	10 (23,81)	69 (7,32)	1 301 (9,07)	71 (15,96)	1 451 (9,20)	29 (8,26)	534 (8,85)	7 051 (8,28)	428 (11,89)	8 042 (8,45)
1992	**	73 (7,75)	1 272 (8,86)	52 (11,69)	1 400 (8,87)	31 (8,83)	495 (8,20)	7 087 (8,32)	372 (10,34)	7 985 (8,39)
1993	**	84 (8,92)	1 155 (8,05)	53 (11,91)	1 293 (8,19)	27 (7,69)	520 (8,61)	6 799 (7,98)	402 (11,17)	7 748 (8,14)
1994	**	75 (7,96)	1 181 (8,23)	37 (8,31)	1 297 (8,22)	22 (6,27)	546 (9,04)	6 771 (7,95)	329 (9,14)	7 668 (8,06)
1995	**	73 (7,75)	1 101 (7,67)	28 (6,29)	1 203 (7,62)	15 (4,27)	426 (7,06)	6 601 (7,75)	311 (8,64)	7 353 (7,73)
1996	**	66 (7,01)	958 (6,68)	16 (3,60)	1 044 (6,62)	20 (5,70)	443 (7,34)	6 421 (7,54)	244 (6,78)	7 128 (7,49)
1997	**	76 (8,07)	1 070 (7,46)	14 (3,15)	1 162 (7,36)	24 (6,84)	384 (6,36)	6 148 (7,22)	189 (5,25)	6 745 (7,09)
1998	**	55 (5,84)	986 (6,87)	10 (2,25)	1 054 (6,68)	40 (11,40)	393 (6,51)	6 210 (7,29)	171 (4,75)	6 814 (7,16)
1999	**	60 (6,37)	909 (6,33)	**	979 (6,20)	24 (6,84)	444 (7,35)	6 020 (7,07)	138 (3,83)	6 626 (6,96)
2000	**	82 (8,70)	892 (6,22)	**	982 (6,22)	16 (4,56)	391 (6,48)	5 862 (6,88)	89 (2,47)	6 358 (6,68)
2001	**	74 (7,86)	824 (5,74)	**	905 (5,74)	28 (7,98)	426 (7,06)	5 682 (6,67)	100 (2,78)	6 236 (6,55)
Total	42 (100,00)	942 (100,00)	14 350 (100,00)	445 (100,00)	15 779 (100,00)	351 (100,00)	6 037 (100,00)	85 176 (100,00)	3 599 (100,00)	95 163 (100,00)

Remarque : **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 25 : Poids à la naissance selon l'âge de la mère et poids à la naissance dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Régions de la santé 5 et 6				Population-type du Nouveau-Brunswick				Ratio des taux (IPN)	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Poids à la naissance			Taux	Poids à la naissance			Taux				
	Total des naissances (%)	< 2 500 grammes (%)	≥ 2 500 grammes (%)		Total des naissances (%)	< 2 500 grammes (%)	≥ 2 500 grammes (%)					
1989	1 485 (9,41)	89 (10,36)	1 396 (9,36)	59,93	8 166 (8,58)	472 (9,32)	7 694 (8,54)	57,80	1,04	0,80	1,27	0,79
1990	1 524 (9,66)	90 (10,48)	1 434 (9,61)	59,06	8 294 (8,72)	410 (8,09)	7 884 (8,75)	49,43	1,19	0,92	1,47	0,13
1991	1 451 (9,20)	78 (9,08)	1 373 (9,20)	53,76	8 042 (8,45)	447 (8,83)	7 595 (8,43)	55,58	0,97	0,73	1,20	0,73
1992	1 400 (8,87)	73 (8,50)	1 327 (8,89)	52,14	7 985 (8,39)	435 (8,59)	7 550 (8,38)	54,48	0,96	0,72	1,19	0,67
1993	1 293 (8,19)	67 (7,80)	1 226 (8,22)	51,82	7 748 (8,14)	433 (8,55)	7 315 (8,12)	55,89	0,93	0,69	1,17	0,51
1994	1 297 (8,22)	73 (8,50)	1 224 (8,20)	56,28	7 668 (8,06)	456 (9,00)	7 212 (8,00)	59,47	0,95	0,71	1,18	0,61
1995	1 203 (7,62)	64 (7,45)	1 139 (7,63)	53,20	7 353 (7,73)	344 (6,79)	7 009 (7,78)	46,78	1,14	0,83	1,44	0,37
1996	1 044 (6,62)	50 (5,82)	994 (6,66)	47,89	7 128 (7,49)	370 (7,31)	6 758 (7,50)	51,91	0,92	0,65	1,20	0,53
1997	1 162 (7,36)	65 (7,57)	1 097 (7,35)	55,94	6 745 (7,09)	353 (6,97)	6 392 (7,09)	52,34	1,07	0,79	1,35	0,66
1998	1 054 (6,68)	51 (5,94)	1 003 (6,72)	48,39	6 814 (7,16)	371 (7,32)	6 443 (7,15)	54,45	0,89	0,63	1,15	0,37
1999	979 (6,20)	55 (6,40)	924 (6,19)	56,18	6 626 (6,96)	364 (7,19)	6 262 (6,95)	54,94	1,02	0,73	1,31	0,92
2000	982 (6,22)	49 (5,70)	933 (6,25)	49,90	6 358 (6,68)	295 (5,82)	6 063 (6,73)	46,40	1,08	0,75	1,40	0,67
2001	905 (5,74)	55 (6,40)	850 (5,70)	60,77	6 236 (6,55)	315 (6,22)	5 921 (6,57)	50,51	1,20	0,86	1,55	0,22
Total	15 779 (100,00)	859 (100,00)	14 920 (100,00)	54,44	95 163 (100,00)	5 065 (100,00)	90 098 (100,00)	53,22	1,02	0,95	1,10	0,54

Remarque : *Les taux affichés dans le cas d'insuffisance de poids à la naissance (IPN) sont des taux bruts par tranche de 1000 naissances vivantes. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 26 : Ratio des taux de décès chez les nourrissons dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Nombre de naissances	Décès de nourrisson (de 0 à 364 jours)		Nombre de naissances	Décès de nourrisson (de 0 à 364 jours)					
		Nombre	Taux*		Nombre	Taux*				
1989	1 485 (9,41)	8 (9,41)	5,39	8 166 (8,58)	61 (10,87)	7,47	0,72	0,19	1,25	0,30
1990	1 524 (9,66)	14 (16,47)	9,19	8 294 (8,72)	59 (10,52)	7,11	1,29	0,54	2,04	0,48
1991	1 451 (9,20)	11 (12,94)	7,58	8 042 (8,45)	52 (9,27)	6,47	1,17	0,41	1,94	0,76
1992	1 400 (8,87)	6 (7,06)	4,29	7 985 (8,39)	55 (9,80)	6,89	0,62	0,10	1,15	0,19
1993	1 293 (8,19)	**	**	7 748 (8,14)	62 (11,05)	8,00	**	**	**	-
1994	1 297 (8,22)	9 (10,59)	6,94	7 668 (8,06)	40 (7,13)	5,22	1,33	0,37	2,29	0,57
1995	1 203 (7,62)	**	**	7 353 (7,73)	38 (6,77)	5,17	**	**	**	-
1996	1 044 (6,62)	6 (7,06)	5,75	7 128 (7,49)	34 (6,06)	4,77	1,20	0,16	2,25	0,86
1997	1 162 (7,36)	7 (8,24)	6,02	6 745 (7,09)	38 (6,77)	5,63	1,07	0,21	1,93	0,99
1998	1 054 (6,68)	6 (7,06)	5,69	6 814 (7,16)	45 (8,02)	6,60	0,86	0,13	1,60	0,88
1999	979 (6,20)	**	**	6 626 (6,96)	33 (5,88)	4,98	**	**	**	-
2000	982 (6,22)	**	**	6 358 (6,68)	21 (3,74)	3,30	**	**	**	-
2001	905 (5,74)	**	**	6 236 (6,55)	23 (4,10)	3,69	**	**	**	-
Total	15 779 (100,00)	85 (100,00)	5,39	95 163 (100,00)	561 (100,00)	5,90	0,91	0,71	1,12	0,41

Remarque : *Les taux affichés pour les décès de nourrisson sont des taux bruts par tranche de 1000 naissances vivantes. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.
**Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 27 : Ratio des taux de mortinaissances selon l'année et le sexe dans régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Total des naissances	Mortinaissances	Taux*	Total des naissances	Mortinaissances	Taux*				
1989	1 485 (9,41)	13 (14,29)	8,75	8 166 (8,58)	44 (8,13)	5,39	1,62	0,62	2,63	0,17
1990	1 524 (9,66)	9 (9,89)	5,91	8 294 (8,72)	57 (10,54)	6,87	0,86	0,26	1,46	0,55
1991	1 451 (9,20)	12 (13,19)	8,27	8 042 (8,45)	45 (8,32)	5,60	1,48	0,54	2,42	0,3
1992	1 400 (8,87)	11 (12,09)	7,86	7 985 (8,39)	42 (7,76)	5,26	1,49	0,50	2,49	0,31
1993	1 293 (8,19)	7 (7,69)	5,41	7 748 (8,14)	42 (7,76)	5,42	1,00	0,20	1,80	0,84
1994	1 297 (8,22)	**	**	7 668 (8,06)	54 (9,98)	7,04	**	**	**	-
1995	1 203 (7,62)	**	**	7 353 (7,73)	31 (5,73)	4,22	**	**	**	-
1996	1 044 (6,62)	**	**	7 128 (7,49)	37 (6,84)	5,19	**	**	**	-
1997	1 162 (7,36)	9 (9,89)	7,75	6 745 (7,09)	38 (7,02)	5,63	1,37	0,38	2,37	0,51
1998	1 054 (6,68)	**	**	6 814 (7,16)	34 (6,28)	4,99	**	**	**	-
1999	979 (6,20)	**	**	6 626 (6,96)	47 (8,69)	7,09	**	**	**	-
2000	982 (6,22)	**	**	6 358 (6,68)	34 (6,28)	5,35	**	**	**	-
2001	905 (5,74)	**	**	6 236 (6,55)	36 (6,65)	5,77	**	**	**	-
Total	15 779 (100,00)	91 (100,00)	5,77	95 163 (100,00)	541 (100,00)	5,68	1,01	0,79	1,24	0,99

Remarque : *Les taux affichés pour les mortinaissances sont des taux bruts par tranche de 1000 naissances vivantes. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.
**Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 28 : Ratio des taux d'anomalies congénitales dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Année	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Total des naissances	Anomalies congénitales	Taux*	Total des naissances	Anomalies congénitales	Taux*				
1989	1 485 (9,41)	8 (12,90)	5,39	8 166 (8,58)	43 (11,08)	5,27	1,02	0,25	1,80	0,89
1990	1 524 (9,66)	4 (6,45)	2,62	8 294 (8,72)	24 (6,19)	2,89	0,91	0,00	1,87	0,66
1991	1 451 (9,20)	7 (11,29)	4,82	8 042 (8,45)	34 (8,76)	4,23	1,14	0,21	2,07	0,92
1992	1 400 (8,87)	7 (11,29)	5,00	7 985 (8,39)	41 (10,57)	5,13	0,97	0,19	1,75	0,79
1993	1 293 (8,19)	**	**	7 748 (8,14)	56 (14,43)	7,23	**	**	**	**
1994	1 297 (8,22)	12 (19,35)	9,25	7 668 (8,06)	30 (7,73)	3,91	2,36	0,78	3,95	0,01
1995	1 203 (7,62)	4 (6,45)	3,33	7 353 (7,73)	37 (9,54)	5,03	0,66	0,00	1,34	0,31
1996	1 044 (6,62)	6 (9,68)	5,75	7 128 (7,49)	34 (8,76)	4,77	1,20	0,16	2,25	0,86
1997	1 162 (7,36)	5 (8,06)	4,30	6 745 (7,09)	24 (6,19)	3,56	1,21	0,04	2,37	0,89
1998	1 054 (6,68)	1 (1,61)	0,95	6 814 (7,16)	18 (4,64)	2,64	0,36	0,00	1,08	0,17
1999	979 (6,20)	3 (4,84)	3,06	6 626 (6,96)	15 (3,87)	2,26	1,35	0,00	3,03	0,89
2000	982 (6,22)	1 (1,61)	1,02	6 358 (6,68)	18 (4,64)	2,83	0,36	0,00	1,08	0,17
2001	905 (5,74)	0 (0,00)	0,00	6 236 (6,55)	14 (3,61)	2,25	0,00	0,00	0,00	0,07
Total	15 779 (100,00)	62 100,00)	3,93	95 163 (100,00)	388 (100,00)	4,08	0,96	0,71	1,22	0,74

*Les taux affichés pour les anomalies congénitales sont des taux bruts par tranche de 1000 naissances vivantes. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.
**Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 29 : Anomalies congénitales dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Anomalies congénitales (CIM-9)	RS 5 et 6		Population-type du N.-B.		Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	N (%)	Taux	N (%)	Taux				
Toutes les anomalies congénitales (740 à 759)	62 (100,00)	3,93	388 (100,00)	4,08	0,96	0,71	1,22	0,74
Défauts du système nerveux (740 à 742)	11 (17,74)	0,70	47 (12,11)	0,49	1,41	0,48	2,34	0,40
Anomalies oculaires (743)	**	**	**	**	**	**	**	**
Anomalies aux oreilles, au visage ou au cou (744)	0 (0,00)	0,00	15 (3,87)	0,16	0,00	-	-	-
Anomalies cardiaques (745 et 746)	**	**	29 (7,47)	0,30	**	**	**	**
Anomalies de l'appareil circulatoire (747)	0 (0,00)	0,00	**	0,03	**	-	-	-
Anomalies de l'appareil respiratoire (748)	**	**	**	0,04	**	**	**	**
Fente palatine/bec-de-lièvre (749)	**	**	35 (9,02)	0,37	**	**	**	**
Anomalies du tube digestif supérieur (750)	**	**	5 (1,29)	0,05	**	**	**	**
Autres anomalies de l'appareil digestif (751)	**	**	12 (3,09)	0,13	**	**	**	**
Anomalies des organes génitaux (752)	**	**	38 (9,79)	0,40	**	**	**	**
Anomalies de l'appareil urinaire (753)	**	**	11 (2,84)	0,12	**	**	**	**
Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (754 à 756)	19 (30,65)	1,20	126 (32,47)	1,32	0,91	0,47	1,35	0,61
Anomalies du tégument (757)	**	**	14 (3,61)	0,15	**	**	**	**
Anomalies chromosomiques (758)	**	**	25 (6,44)	0,26	**	**	**	**
Anomalies multiples (759)	**	**	21 (5,41)	0,22	**	**	**	**

Remarque : *Les taux affichés pour les anomalies congénitales sont des taux bruts par tranche de 1000 naissances vivantes. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 30 : Ratio des taux de certaines causes de décès (hommes et femmes) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	RS 5 et 6		Population-type du N.-B.		Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	N (%)	Taux*	N (%)	Taux*				
Néoplasmes (140 à 208)	3 274 (28,61)	2,07	17 389 (26,78)	2,14	0,97	0,93	1,01	0,10
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	455 (3,98)	0,29	2 265 (3,49)	0,28	1,03	0,93	1,14	0,53
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	342 (2,99)	0,22	2 184 (3,36)	0,27	0,81	0,71	0,90	<0,001
Appareil circulatoire (390 à 459)	4 041 (35,31)	2,55	25 510 (39,29)	3,13	0,82	0,79	0,84	<0,001
Appareil respiratoire (460 à 519)	960 (8,39)	0,61	5 585 (8,60)	0,69	0,88	0,82	0,95	<0,001
Appareil digestif (520 à 579)	388 (3,39)	0,25	2 223 (3,42)	0,27	0,90	0,80	1,00	0,05
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	230 (2,01)	0,15	1 156 (1,78)	0,14	1,02	0,88	1,17	0,76
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	6 (0,05)	0,00	59 (0,09)	0,01	0,52	0,08	0,96	0,09
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	64 (0,56)	0,04	331 (0,51)	0,04	1,00	0,73	1,26	0,92
Anomalies congénitales (740 à 759)	60 (0,52)	0,04	324 (0,50)	0,04	0,95	0,69	1,22	0,69
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	29 (0,25)	0,02	234 (0,36)	0,03	0,64	0,39	0,88	0,02
Autres causes	1 596 (13,94)	1,01	7 664 (11,80)	0,94	1,07	1,01	1,13	0,01
Toutes les causes	11 445 (100,00)	7,23	64 924 (100,00)	7,97	0,91	0,89	0,93	<0,001

Remarque : *Les taux affichés pour les causes de décès choisies sont des taux bruts par tranche de 100 000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 31 : Ratio des taux de certaines des causes principales de décès (hommes) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	RS 5 et 6		Population-type du N.-B.		Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	N (%)	Taux	N (%)	Taux				
Néoplasmes (140 à 208)	1 926 (29,88)	2,43	9 582 (27,97)	2,38	1,02	0,97	1,07	0,35
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	188 (2,92)	0,24	1 072 (3,13)	0,27	0,89	0,75	1,03	0,14
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	164 (2,54)	0,21	957 (2,79)	0,24	0,87	0,73	1,02	0,10
Appareil circulatoire (390 à 459)	2 168 (33,64)	2,74	12 984 (37,90)	3,22	0,85	0,81	0,89	<0,001
Appareil respiratoire (460 à 519)	578 (8,97)	0,73	3 097 (9,04)	0,77	0,95	0,87	1,04	0,26
Appareil digestif (520 à 579)	218 (3,38)	0,28	1 124 (3,28)	0,28	0,99	0,84	1,13	0,84
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	124 (1,92)	0,16	594 (1,73)	0,15	1,06	0,86	1,27	0,57
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	**	**	24 (0,07)	0,01	**	**	**	**
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	14 (0,22)	0,02	107 (0,31)	0,03	0,67	0,30	1,04	0,12
Anomalies congénitales (740 à 759)	30 (0,47)	0,04	169 (0,49)	0,04	0,90	0,55	1,26	0,54
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	13 (0,20)	0,02	132 (0,39)	0,03	0,50	0,22	0,79	0,01
Autres causes	1 017 (15,78)	1,29	4 419 (12,90)	1,10	1,17	1,09	1,25	<0,001
Toutes les causes	6 445 (100,00)	8,15	34 261 (100,00)	8,50	0,96	0,93	0,98	0,001

Remarque : *Les taux affichés pour les causes de décès choisies sont des taux bruts par tranche de 100 000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.
**Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 32 : Ratio des taux de certaines des causes principales de décès (femmes) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	RS 5 et 6		Population-type du N.-B.		Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	N (%)	Taux	N (%)	Taux				
Néoplasmes (140 à 208)	1 348 (26,96)	1,70	7 807 (25,46)	1,90	0,90	0,85	0,95	<,0001
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	267 (5,34)	0,34	1 193 (3,89)	0,29	1,16	1,01	1,32	0,03
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	178 (3,56)	0,22	1 227 (4,00)	0,30	0,75	0,64	0,87	<,0001
Appareil circulatoire (390 à 459)	1 873 (37,46)	2,37	12 526 (40,85)	3,04	0,78	0,74	0,82	<,0001
Appareil respiratoire (460 à 519)	382 (7,64)	0,48	2 488 (8,11)	0,60	0,80	0,71	0,88	<,0001
Appareil digestif (520 à 579)	170 (3,40)	0,21	1 099 (3,58)	0,27	0,80	0,67	0,93	0,001
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	106 (2,12)	0,13	562 (1,83)	0,14	0,98	0,78	1,18	0,82
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	**	**	**	**	**	**	**	**
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	50 (1,00)	0,06	224 (0,73)	0,05	1,16	0,81	1,52	0,38
Anomalies congénitales (740 à 759)	30 (0,60)	0,04	155 (0,51)	0,04	1,01	0,61	1,40	0,99
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	16 (0,32)	0,02	102 (0,33)	0,02	0,82	0,39	1,25	0,38
Autres causes	579 (11,58)	0,73	3 245 (10,58)	0,79	0,93	0,85	1,01	0,09
Toutes les causes	5 000 (100,00)	6,32	30 663 (100,00)	7,45	0,85	0,82	0,87	<,0001

Remarque : *Les taux affichés pour les causes de décès choisies sont des taux bruts par tranche de 100 000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.
**Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 33 : Taux de mortalité proportionnel (régions de la santé 5 et 6), de 1989 à 2001

Cause de décès	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	N	TMP*	Valeur *p*	N	TMP*	Valeur *p*	N	TMP*	Valeur *p*
Néoplasmes (140 à 208)	3274	1,07	<0,05	1926	1,07	<0,05	1348	1,06	<0,05
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	455	1,14	<0,05	188	0,93	0,33	267	1,37	<0,05
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	342	0,89	<0,05	164	0,91	0,23	178	0,89	0,12
Appareil circulatoire (390 à 459)	4041	0,90	<0,05	2168	0,89	<0,05	1873	0,92	<0,05
Appareil respiratoire (460 à 519)	960	0,98	0,43	578	0,99	0,85	382	0,94	0,24
Appareil digestif (520 à 579)	388	0,99	0,84	218	1,03	0,65	170	0,95	0,49
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	230	1,13	0,07	124	1,11	0,25	106	1,16	0,13
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	6	0,58	0,17	**	**	**	**	**	**
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	64	1,10	0,46	14	0,70	0,17	50	1,37	<0,05
Anomalies congénitales (740 à 759)	60	1,05	0,71	30	0,94	0,75	30	1,19	0,35
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	29	0,70	0,06	13	0,52	<0,05	16	0,96	0,87
Autres causes	1596	1,18	<0,05	1017	1,22	<0,05	579	1,09	<0,05
Toutes les causes	11 445	-	-	6445	-	-	5000	-	-

Remarque : *TMP – taux de mortalité proportionnel brut. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 34 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) par cause de décès dans les régions de la santé 5 et 6, hommes et femmes combinés, de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	Observé	Prévu	RSM	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
Néoplasmes (140 à 208)	3 274	3 184,10	1,03	0,99	1,04	0,11
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	455	408,89	1,11	1,01	1,20	0,03
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	342	389,74	0,88	0,78	0,97	0,02
Appareil circulatoire (390 à 459)	4 041	4 556,36	0,89	0,86	0,89	<,0001
Appareil respiratoire (460 à 519)	960	991,07	0,97	0,91	1,00	0,32
Appareil digestif (520 à 579)	388	401,88	0,97	0,87	1,05	0,49
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	230	205,49	1,12	0,97	1,29	0,09
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	6	10,61	0,57	0,11	3,83	0,16
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	64	59,22	1,08	0,82	1,67	0,53
Anomalies congénitales (740 à 759)	60	59,79	1,00	0,75	1,58	0,98
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	29	42,01	0,69	0,44	1,52	0,05
Autres causes	1 596	1 420,03	1,12	1,07	1,15	<,0001
Toutes les causes	11 445	11 729,19	0,98	0,96	0,98	0,01

Remarque : LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 35 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) par cause de décès dans les régions de la santé 5 et 6, chez les hommes de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	Observé	Prévu	RSM	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
Néoplasmes (140 à 208)	1 926	1 841,38	1,05	1,00	1,06	0,05
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	188	205,76	0,91	0,78	1,08	0,22
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	164	182,74	0,90	0,76	1,09	0,17
Appareil circulatoire (390 à 459)	2 168	2 485,49	0,87	0,84	0,89	<,0001
Appareil respiratoire (460 à 519)	578	588,94	0,98	0,90	1,04	0,07
Appareil digestif (520 à 579)	218	216,89	1,01	0,87	1,17	0,94
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	124	113,51	1,09	0,90	1,40	0,33
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	**	**	1,08	0,13	8,58	-
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	14	20,32	0,69	0,33	2,40	0,16
Anomalies congénitales (740 à 759)	30	31,21	0,96	0,62	2,07	0,83
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	13	23,44	0,55	0,25	2,03	-
Autres causes	1 017	861,88	1,18	1,11	1,22	<,0001
Toutes les causes	6 445	6 576,18	0,98	0,96	0,99	0,11

Remarque : LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 36 : Ratio standardisé de mortalité (RSM) par cause de décès dans les régions de la santé 5 et 6, chez les femmes, de 1989 à 2001

Catégorie de maladie (CIM-9)	Observé	Prévu	RSM	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
Néoplasmes (140 à 208)	1 348	1 381,69	0,98	0,92	1,00	0,36
Troubles endocriniens et métaboliques (240 à 279)	267	205,21	1,30	1,15	1,47	<,0001
Système nerveux et organes sensoriels (320 à 389)	178	207,94	0,86	0,73	1,02	0,04
Appareil circulatoire (390 à 459)	1 873	2 114,15	0,89	0,85	0,90	<,0001
Appareil respiratoire (460 à 519)	382	421,50	0,91	0,82	0,99	0,05
Appareil digestif (520 à 579)	170	187,81	0,91	0,77	1,09	0,19
Appareil génito-urinaire (580 à 629)	106	95,05	1,12	0,90	1,48	0,26
Peau et tissus sous-cutanés (680 à 709)	**	**	0,17	0,16	5,94	-
Système ostéo-articulaire, muscles et tissus conjonctifs (710 à 739)	50	38,40	1,30	0,94	2,21	0,06
Anomalies congénitales (740 à 759)	30	28,50	1,05	0,68	2,27	0,78
États ayant leur source à la période périnatale (760 à 779)	16	18,53	0,86	0,44	2,74	0,56
Autres causes	579	563,94	1,03	0,94	1,09	0,53
Toutes les causes	5 000	5 268,72	0,95	0,92	0,96	0,001

Remarque : LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Annexe 3 : Incidence du cancer

Tableau 37 : Ratio d'incidence standardisé (GRB), de 1989 à 2001

Cause de décès	Hommes				Femmes			
	RIS	LCI	LCS	Valeur *p*	RIS	LCI	LCS	Valeur *p*
Tous les cancers (140 à 208)	1,53	1,34	1,72	<0,05	1,13	0,95	1,31	0,13
Cancers de l'appareil respiratoire (160 à 165)	1,83	1,39	2,27	<0,05	1,33	0,79	1,88	0,17
Cavité nasale, oreille moyenne et sinus (160)	**	**	**	**	**	**	**	**
Larynx (161)	**	**	**	**	**	**	**	**
Trachée, bronches ou poumons (162)	1,90	1,43	2,37	<0,05	1,34	0,78	1,90	0,17
Plèvre (163)	**	**	**	**	**	**	**	**
Thymus, cœur, médiastin (164)	**	**	**	**	**	**	**	**
Autres sièges mal circonscrits (165)	**	**	**	**	**	**	**	**
Cancer de la prostate (185)	1,44	1,08	1,79	<0,05	-	-	-	-
Cancer du sein (174)	**	**	**	**	0,83	0,55	1,11	0,28
Cancer de la vessie (188)	1,09	0,45	1,74	0,77	**	**	**	**
Cancer du rein (189)	1,57	0,54	2,59	0,18	1,54	0,31	2,76	0,29
Cancer du pancréas (157)	**	**	**	**	**	**	**	**
Cancer de l'estomac (151)	4,14	2,23	6,05	<0,05	2,75	0,55	4,96	**
Cancer colorectal (153 et 154)	1,07	0,53	1,61	0,80				
Cancers de la bouche (140 à 149)	2,87	1,36	4,37	<0,05	**	**	**	**
Cancer de la thyroïde (193)	**	**	**	**	**	**	**	**
Cancer chez les enfants								
Tous les cancers (140 à 208)	**	**	**	**	**	**	**	**
Maladie de Hodgkin (201)	**	**	**	**	**	**	**	**
Leucémie (204 à 208)	**	**	**	**	**	**	**	**

Remarque : *RIS – Ratio d'incidence standardisé. LCI/LCS – limites inférieures/supérieures de l'intervalle de confiance à 95 p. 100. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Tableau 38 : Ratio d'incidence standardisé (RS 5 et 6), de 1989 à 2001

Cause de décès	Hommes				Femmes			
	RIS	LCI	LCS	Valeur *p*	RIS	LCI	LCS	Valeur *p*
Tous les cancers (140 à 208)	1,02	0,98	1,05	0,31	0,93	0,90	0,97	<0,05
Cancers de l'appareil respiratoire (160 à 165)	1,07	1,00	1,14	0,05	0,89	0,80	0,99	<0,05
Cavité nasale, oreille moyenne et sinus (160)	0,91	0,11	1,72	0,84	**	**	**	**
Larynx (161)	1,09	0,82	1,35	0,51	1,34	0,70	1,97	0,25
Trachée, bronches ou poumons (162)	1,07	0,99	1,14	0,07	0,86	0,77	0,96	<0,05
Plèvre (163)	1,16	0,44	1,88	0,63	**	**	**	**
Thymus, cœur, médiastin (164)	**	**	**	**	**	**	**	**
Autres sièges mal circonscrits (165)	**	**	**	**	**	**	**	**
Cancer de la prostate (185)	1,02	0,96	1,09	0,49	-	-	-	-
Cancer du sein (174)	**	**	**	**	0,90	0,83	0,96	<0,05
Cancer de la vessie (188)	0,97	0,84	1,10	0,67	0,83	0,62	1,03	0,14
Cancer du rein (189)	1,06	0,88	1,24	0,50	1,09	0,87	1,31	0,39
Cancer du pancréas (157)	1,10	0,88	1,33	0,36	1,18	0,93	1,42	0,13
Cancer de l'estomac (151)	1,75	1,49	2,01	<0,05	1,76	1,39	2,13	<0,05
Cancer colorectal (153 à 154)	0,77	0,67	0,87	<0,05	0,70	0,61	0,80	<0,05
Cancers de la bouche (140 à 149)	1,03	0,84	1,22	0,77	1,38	0,98	1,79	<0,05
Cancer de la thyroïde (193)	1,06	0,57	1,55	0,79	1,42	1,10	1,75	<0,05
Cancer chez les enfants								
Tous les cancers (140 à 208)	1,01	0,68	1,34	0,96	1,02	0,65	1,38	0,92
Maladie de Hodgkin (201)	1,13	0,46	1,79	0,69	1,26	0,39	2,13	0,52
Leucémie (204 à 208)	0,98	0,00	2,09	0,95	0,44	0,00	1,31	0,4

Remarque : *RIS – ratio d'incidence standardisé. LCI/LCS – limites inférieures/supérieures de l'intervalle de confiance à 95 p. 100. **Données supprimées en raison du faible nombre (n ≤ 5).

Annexe 4 : Diagnostics-congés des hôpitaux

Vue d'ensemble

Tableau 39 : Nombre total de congés des hôpitaux selon l'exercice financier et la zone géographique, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Grande région de Belledune (%)	Régions de la santé 5 et 6 (%)	Nouveau-Brunswick
1989-1990	1 254 (0,82)	26 010 (17,11)	152 031
1990-1991	1 258 (0,82)	26 377 (17,11)	154 118
1991-1992	1 323 (0,84)	26 638 (16,87)	157 890
1992-1993	1 277 (0,81)	27 995 (17,84)	156 943
1993-1994	1 334 (0,85)	28 399 (18,12)	156 754
1994-1995	1 389 (0,85)	28 755 (17,66)	162 788
1995-1996	1 355 (0,81)	28 664 (17,06)	168 057
1996-1997	1 299 (0,82)	26 847 (17,00)	157 891
1997-1998	1 182 (0,75)	27 199 (17,28)	157 382
1998-1999	1 366 (0,76)	27 497 (15,34)	179 303
1999-2000	1 267 (0,71)	26 663 (14,84)	179 654
2000-2001	1 222 (0,70)	25 265 (14,47)	174 557
2001-2002	1 227 (0,70)	24 798 (14,13)	175 439
Total	16 753 (0,79)	351 107 (16,46)	2 132 807

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

Tableau 40 : Nombre total de congés des hôpitaux selon le groupe d'âge et la zone géographique, de 1989-1990 à 2001-2002

Groupe d'âge	Grande région de Belledune (%)		Régions de la santé 5 et 6 (%)		Nouveau-Brunswick	
	Hommes N (%)	Femmes N (%)	Hommes N (%)	Femmes N (%)	Hommes N (%)	Femmes N (%)
De 0 à 9 ans	737 (9,85)	701 (7,56)	18 823 (12,12)	13 874 (7,09)	90 543 (9,71)	64 311 (5,36)
De 10 à 19 ans	412 (5,50)	535 (5,77)	9 487 (6,11)	12 910 (6,59)	51 864 (5,56)	73 343 (6,11)
De 20 à 29 ans	502 (6,71)	1 557 (16,80)	9 915 (6,38)	30 763 (15,71)	62 333 (6,69)	189 600 (15,79)
De 30 à 39 ans	754 (10,07)	1 281 (13,82)	16 107 (10,37)	29 595 (15,12)	93 503 (10,03)	177 440 (14,78)
De 40 à 49 ans	985 (13,16)	1 332 (14,37)	18 846 (12,13)	25 141 (12,84)	110 105 (11,81)	145 054 (12,08)
De 50 à 59 ans	1 154 (15,42)	892 (9,63)	20 643 (13,29)	20 191 (10,31)	121 853 (13,07)	123 334 (10,27)
De 60 à 69 ans	1 235 (16,50)	1 172 (12,65)	23 125 (14,89)	20 598 (10,52)	151 267 (16,22)	135 377 (11,28)
De 70 à 79 ans	1 115 (14,89)	1 041 (11,23)	23 808 (15,33)	23 112 (11,81)	161 792 (17,35)	163 136 (13,59)
80 ans +	592 (7,91)	756 (8,16)	14 587 (9,39)	19 582 (10,00)	89 149 (9,56)	128 803 (10,73)
Total	7 486 (100,00)	9 267 (100,00)	155 341 (100,00)	195 766 (100,00)	932 409 (100,00)	1 200 398 (100,00)

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

Tableau 41 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil respiratoire (CIM-9 : 460 à 519) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	4 668	108	23,14	614 522	11 853	19,29	1,20	0,97	1,43	0,06
1990-1991	4 645	131	28,20	619 189	11 728	18,94	1,49	1,23	1,75	<0,01
1991-1992	5 400	118	21,85	621 484	12 496	20,11	1,09	0,89	1,28	0,39
1992-1993	5 405	117	21,65	624 420	11 639	18,64	1,16	0,95	1,37	0,12
1993-1994	5 401	118	21,85	625 577	11 732	18,75	1,16	0,95	1,38	0,11
1994-1995	5 381	117	21,74	627 539	11 937	19,02	1,14	0,93	1,35	0,16
1995-1996	5 356	146	27,26	629 006	12 723	20,23	1,35	1,13	1,57	<0,01
1996-1997	5 338	117	21,92	630 777	11 295	17,91	1,22	1,00	1,45	0,03
1997-1998	5 328	92	17,27	632 355	11 699	18,50	0,93	0,74	1,12	0,51
1998-1999	5 288	123	23,26	632 498	11 581	18,31	1,27	1,04	1,50	<0,01
1999-2000	5 250	119	22,67	634 432	10 891	17,17	1,32	1,08	1,56	<0,01
2000-2001	5 226	94	17,99	637 312	9 671	15,17	1,19	0,94	1,43	0,11
2001-2002	4 935	121	24,52	615 105	9 754	15,86	1,55	1,27	1,82	<0,01
Total	67 621	1 521	22,49	8 144 216	148 999	18,30	1,23	1,17	1,29	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 42 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil circulatoire (CIM-9 : 390 à 459) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par année, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	4 668	105	22,49	614 522	12 719	20,70	1,09	0,88	1,30	0,42
1990-1991	4 645	104	22,39	619 189	12 956	20,92	1,07	0,86	1,28	0,58
1991-1992	5 400	161	29,81	621 484	14 047	22,60	1,32	1,11	1,52	<0,01
1992-1993	5 405	154	28,49	624 420	13 739	22,00	1,29	1,09	1,50	<0,01
1993-1994	5 401	173	32,03	625 577	13 662	21,84	1,47	1,25	1,69	<0,01
1994-1995	5 381	179	33,27	627 539	13 322	21,23	1,57	1,34	1,80	<0,01
1995-1996	5 356	122	22,78	629 006	14 243	22,64	1,01	0,83	1,19	0,97
1996-1997	5 338	167	31,29	630 777	14 016	22,22	1,41	1,19	1,62	<0,01
1997-1998	5 328	176	33,03	632 355	14 026	22,18	1,49	1,27	1,71	<0,01
1998-1999	5 288	168	31,77	632 498	14 401	22,77	1,40	1,18	1,61	<0,01
1999-2000	5 250	173	32,95	634 432	14 676	23,13	1,42	1,21	1,64	<0,01
2000-2001	5 226	154	29,47	637 312	14 329	22,48	1,31	1,10	1,52	<0,01
2001-2002	4 935	146	29,58	615 105	14 240	23,15	1,28	1,07	1,49	<0,01
Total	67 621	1 982	29,31	8 144 216	180 376	22,15	1,32	1,26	1,38	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 43 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil digestif (CIM-9 : 520 à 579) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	4 668	163	34,92	614 522	16 042	26,10	1,34	1,13	1,54	<0,01
1990-1991	4 645	182	39,18	619 189	16 442	26,55	1,48	1,26	1,69	<0,01
1991-1992	5 400	170	31,48	621 484	16 511	26,57	1,18	1,01	1,36	0,03
1992-1993	5 405	167	30,90	624 420	16 188	25,92	1,19	1,01	1,37	0,02
1993-1994	5 401	162	29,99	625 577	16 185	25,87	1,16	0,98	1,34	0,06
1994-1995	5 381	190	35,31	627 539	17 591	28,03	1,26	1,08	1,44	<0,01
1995-1996	5 356	179	33,42	629 006	19 457	30,93	1,08	0,92	1,24	0,32
1996-1997	5 338	175	32,78	630 777	17 148	27,19	1,21	1,03	1,39	<0,01
1997-1998	5 328	153	28,72	632 355	16 763	26,51	1,08	0,91	1,26	0,34
1998-1999	5 288	164	31,01	632 498	17 606	27,84	1,11	0,94	1,29	0,17
1999-2000	5 250	117	22,29	634 432	16 813	26,50	0,84	0,69	0,99	0,05
2000-2001	5 226	147	28,13	637 312	16 472	25,85	1,09	0,91	1,27	0,32
2001-2002	4 935	116	23,51	615 105	16 046	26,09	0,90	0,74	1,07	0,26
Total	67 621	2 085	30,83	8 144 216	219 264	26,92	1,15	1,10	1,19	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 44 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil génito-urinaire (CIM-9 : 580 à 629) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	4 668	125	26,78	614 522	15 731	25,60	1,05	0,86	1,23	0,65
1990-1991	4 645	122	26,26	619 189	15 326	24,75	1,06	0,87	1,25	0,54
1991-1992	5 400	142	26,30	621 484	15 971	25,70	1,02	0,85	1,19	0,82
1992-1993	5 405	127	23,50	624 420	15 654	25,07	0,94	0,77	1,10	0,46
1993-1994	5 401	138	25,55	625 577	15 444	24,69	1,03	0,86	1,21	0,72
1994-1995	5 381	169	31,41	627 539	15 848	25,25	1,24	1,06	1,43	<0,01
1995-1996	5 356	169	31,55	629 006	15 360	24,42	1,29	1,10	1,49	<0,01
1996-1997	5 338	158	29,60	630 777	14 547	23,06	1,28	1,08	1,48	<0,01
1997-1998	5 328	126	23,65	632 355	13 290	21,02	1,13	0,93	1,32	0,20
1998-1999	5 288	144	27,23	632 498	13 [illegible]	21,47	1,27	1,06	1,48	<0,01
1999-2000	5 250	152	28,95	634 432	13 601	21,44	1,35	1,13	1,57	<0,01
2000-2001	5 226	131	25,07	637 312	12 741	19,99	1,25	1,04	1,47	<0,01
2001-2002	4 935	143	28,98	615 105	11 235	18,27	1,59	1,32	1,85	<0,01
Total	67 621	1 846	27,30	8 144 216	188 327	23,12	1,18	1,13	1,23	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 45 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale un trouble endocrinien, nutritionnel ou métabolique (CIM-9 : 240 à 279) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	4 668	31	6,64	733 326	2 513	3,43	1,94	1,25	2,62	<0,01
1990-1991	4 645	16	3,44	738 310	2 596	3,52	0,98	0,50	1,46	0,84
1991-1992	5 400	19	3,52	740 146	2 450	3,31	1,06	0,58	1,54	0,89
1992-1993	5 405	19	3,52	743 058	2 527	3,40	1,03	0,57	1,50	0,99
1993-1994	5 401	13	2,41	744 129	2 442	3,28	0,73	0,33	1,13	0,21
1994-1995	5 381	28	5,20	745 561	2 356	3,16	1,65	1,03	2,26	0,01
1995-1996	5 356	27	5,04	746 426	2 451	3,28	1,54	0,95	2,12	0,03
1996-1997	5 338	18	3,37	747 657	2 474	3,31	1,02	0,55	1,49	0,99
1997-1998	5 328	25	4,69	748 909	2 652	3,54	1,33	0,80	1,85	0,20
1998-1999	5 288	36	6,81	748 133	2 907	3,89	1,75	1,18	2,33	<0,01
1999-2000	5 250	26	4,95	749 098	3 032	4,05	1,22	0,75	1,70	0,36
2000-2001	5 226	23	4,40	751 372	3 180	4,23	1,04	0,61	1,47	0,92
2001-2002	4 935	27	5,47	722 700	3 008	4,16	1,31	0,82	1,81	0,19
Total	67 621	308	4,55	9 658 825	34 588	3,58	1,27	1,13	1,41	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 46 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de la peau ou des tissus sous-cutanés (CIM-9 : 680 à 709) dans la grande région de Belledune (GRB) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick. par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Grande région de Belledune			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	4 668	17	3,64	614 522	2 263	3,68	0,99	0,52	1,46	0,99
1990-1991	4 645	22	4,74	619 189	2 280	3,68	1,29	0,75	1,83	0,29
1991-1992	5 400	22	4,07	621 484	2 083	3,35	1,22	0,70	1,73	0,43
1992-1993	5 405	27	5,00	624 420	2 086	3,34	1,50	0,93	2,06	0,05
1993-1994	5 401	24	4,44	625 577	1 924	3,08	1,44	0,86	2,03	0,10
1994-1995	5 381	27	5,02	627 539	2 125	3,39	1,48	0,92	2,04	0,06
1995-1996	5 356	33	6,16	629 006	2 137	3,40	1,81	1,19	2,44	<0,01
1996-1997	5 338	22	4,12	630 777	1 965	3,12	1,32	0,77	1,88	0,24
1997-1998	5 328	18	3,38	632 355	2 107	3,33	1,01	0,54	1,48	0,99
1998-1999	5 288	17	3,21	632 498	2 098	3,32	0,97	0,51	1,43	0,99
1999-2000	5 250	16	3,05	634 432	2 010	3,17	0,96	0,49	1,44	0,92
2000-2001	5 226	17	3,25	637 312	1 685	2,64	1,23	0,64	1,82	0,47
2001-2002	4 935	16	3,24	615 105	1 567	2,55	1,27	0,65	1,90	0,41
Total	67 621	278	4,11	8 144 216	26 330	3,23	1,27	1,12	1,42	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 47 : Ratio standardisé de morbidité (RSM) dans le cas de certains diagnostics-congés selon le diagnostic principal, dans la grande région de Belledune, de 1989-1990 à 2001-2002

Diagnostic principal (CIM-9)	Observé	Prévu	RSM	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
Maladie de l'appareil respiratoire (CIM-9 : 460 à 519)	1 521	1 186,15	1,28	1,22	1,35	<0,01
Maladie de l'appareil circulatoire (CIM-9 : 390 à 459)	1 982	1 492,31	1,33	1,27	1,39	<0,01
Maladie de l'appareil digestif (CIM-9 : 520 à 579)	2 085	1 832,19	1,14	1,09	1,19	<0,01
Maladie de l'appareil génito-urinaire (CIM-9 : 580 à 629)	1 846	1 597,00	1,16	1,10	1,21	<0,01
Troubles endocriniens, nutritionnels et métaboliques (CIM-9 : 240 à 279)	308	229,16	1,34	1,19	1,49	<0,01
Peau et tissus sous-cutanés (CIM-9 : 680 à 709)	278	219,09	1,27	1,12	1,42	<0,01
Toutes les causes	16 753	14 715,45	1,14	1,12	1,16	<0,01

Tableau 48 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil respiratoire (CIM-9 : 460 à 519) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	123 472	3 194	25,87	614 522	11 853	19,29	1,34	1,29	1,39	<0,01
1990-1991	123 766	3 134	25,32	619 189	11 728	18,94	1,34	1,28	1,39	<0,01
1991-1992	124 062	3 183	25,66	621 484	12 496	20,11	1,28	1,23	1,33	<0,01
1992-1993	124 043	3 243	26,14	624 420	11 639	18,64	1,40	1,35	1,46	<0,01
1993-1994	123 953	3 633	29,31	625 577	11 732	18,75	1,56	1,50	1,62	<0,01
1994-1995	123 403	3 238	26,24	627 539	11 937	19,02	1,38	1,33	1,43	<0,01
1995-1996	122 776	3 248	26,45	629 006	12 723	20,23	1,31	1,26	1,36	<0,01
1996-1997	122 218	2 750	22,50	630 777	11 295	17,91	1,26	1,20	1,31	<0,01
1997-1998	121 882	2 932	24,06	632 355	11 699	18,50	1,30	1,25	1,35	<0,01
1998-1999	120 923	2 974	24,59	632 498	11 581	18,31	1,34	1,29	1,40	<0,01
1999-2000	119 916	2 780	23,18	634 432	10 891	17,17	1,35	1,29	1,41	<0,01
2000-2001	119 286	2 247	18,84	637 312	9 671	15,17	1,24	1,18	1,30	<0,01
2001-2002	112 530	2 311	20,54	615 105	9 754	15,86	1,30	1,24	1,35	<0,01
Total	1 582 230	38 867	24,56	8 144 216	148 999	18,30	1,34	1,33	1,36	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 49 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil circulatoire (CIM-9 : 390 à 459) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux	Population	Total	Taux				
1989-1990	123 472	2 213	17,92	614 522	12 719	20,70	0,87	0,83	0,91	<0,01
1990-1991	123 766	2 325	18,79	619 189	12 956	20,92	0,90	0,86	0,94	<0,01
1991-1992	124 062	2 601	20,97	621 484	14 047	22,60	0,93	0,89	0,97	<0,01
1992-1993	124 043	2 797	22,55	624 420	13 739	22,00	1,02	0,98	1,07	0,24
1993-1994	123 953	3 163	25,52	625 577	13 662	21,84	1,17	1,12	1,21	<0,01
1994-1995	123 403	2 921	23,67	627 539	13 322	21,23	1,12	1,07	1,16	<0,01
1995-1996	122 776	3 030	24,68	629 006	14 243	22,64	1,09	1,05	1,13	<0,01
1996-1997	122 218	3 075	25,16	630 777	14 016	22,22	1,13	1,09	1,18	<0,01
1997-1998	121 882	3 164	25,96	632 355	14 026	22,18	1,17	1,13	1,22	<0,01
1998-1999	120 923	2 929	24,22	632 498	14 401	22,77	1,06	1,02	1,11	<0,01
1999-2000	119 916	3 008	25,08	634 432	14 676	23,13	1,08	1,04	1,13	<0,01
2000-2001	119 286	2 999	25,14	637 312	14 329	22,48	1,12	1,07	1,16	<0,01
2001-2002	112 530	2 920	25,95	615 105	14 240	23,15	1,12	1,08	1,17	<0,01
Total	1 582 230	37 145	23,48	8 144 216	180 376	22,15	1,06	1,05	1,07	<0,01

*Taux brut par tranche de 1000 individus.

Tableau 50 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil digestif (CIM-9 : 520 à 579) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	123 472	4 138	33,51	614 522	16 042	26,10	1,28	1,24	1,33	<0,01
1990-1991	123 766	4 180	33,77	619 189	16 442	26,55	1,27	1,23	1,32	<0,01
1991-1992	124 062	3 984	32,11	621 484	16 511	26,57	1,21	1,17	1,25	<0,01
1992-1993	124 043	4 050	32,65	624 420	16 188	25,92	1,26	1,22	1,30	<0,01
1993-1994	123 953	4 056	32,72	625 577	16 185	25,87	1,26	1,22	1,31	<0,01
1994-1995	123 403	4 225	34,24	627 539	17 591	28,03	1,22	1,18	1,26	<0,01
1995-1996	122 776	4 280	34,86	629 006	19 457	30,93	1,13	1,09	1,16	<0,01
1996-1997	122 218	3 851	31,51	630 777	17 148	27,19	1,16	1,12	1,20	<0,01
1997-1998	121 882	3 716	30,49	632 355	16 763	26,51	1,15	1,11	1,19	<0,01
1998-1999	120 923	3 620	29,94	632 498	17 606	27,84	1,08	1,04	1,11	<0,01
1999-2000	119 916	3 603	30,05	634 432	16 813	26,50	1,13	1,09	1,17	<0,01
2000-2001	119 286	3 232	27,09	637 312	16 472	25,85	1,05	1,01	1,09	0,01
2001-2002	112 530	3 013	26,78	615 105	16 046	26,09	1,03	0,99	1,07	0,19
Total	1 582 230	49 948	31,57	8 144 216	219 264	26,92	1,17	1,16	1,18	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 51 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de l'appareil génito-urinaire (CIM-9 : 580 à 629) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	123 472	2 808	22,74	614 522	15 731	25,60	0,89	0,85	0,92	<0,01
1990-1991	123 766	2 771	22,39	619 189	15 326	24,75	0,90	0,87	0,94	<0,01
1991-1992	124 062	2 733	22,03	621 484	15 971	25,70	0,86	0,82	0,89	<0,01
1992-1993	124 043	2 883	23,24	624 420	15 654	25,07	0,93	0,89	0,96	<0,01
1993-1994	123 953	3 082	24,86	625 577	15 444	24,69	1,01	0,97	1,05	0,72
1994-1995	123 403	3 541	28,69	627 539	15 848	25,25	1,14	1,09	1,18	<0,01
1995-1996	122 776	3 150	25,66	629 006	15 360	24,42	1,05	1,01	1,09	0,01
1996-1997	122 218	2 901	23,74	630 777	14 547	23,06	1,03	0,99	1,07	0,15
1997-1998	121 882	2 663	21,85	632 355	13 290	21,02	1,04	1,00	1,08	0,06
1998-1999	120 923	2 781	23,00	632 498	13 579	21,47	1,07	1,03	1,11	<0,01
1999-2000	119 916	2 708	22,58	634 432	13 601	21,44	1,05	1,01	1,10	0,02
2000-2001	119 286	2 516	21,09	637 312	12 741	19,99	1,06	1,01	1,10	0,02
2001-2002	112 530	2 496	22,18	615 105	11 235	18,27	1,21	1,16	1,27	<0,01
Total	1 582 230	37 033	23,41	8 144 216	188 327	23,12	1,01	1,00	1,02	0,03

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 52 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale un trouble endocrinien, nutritionnel ou métabolique (CIM-9 : 240 à 279) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	123 472	543	4,40	614 522	2 001	3,26	1,35	1,22	1,48	<0,01
1990-1991	123 766	577	4,66	619 189	2 035	3,29	1,42	1,29	1,55	<0,01
1991-1992	124 062	500	4,03	621 484	1 969	3,17	1,27	1,15	1,40	<0,01
1992-1993	124 043	555	4,47	624 420	1 991	3,19	1,40	1,27	1,54	<0,01
1993-1994	123 953	508	4,10	625 577	1 947	3,11	1,32	1,19	1,45	<0,01
1994-1995	123 403	499	4,04	627 539	1 885	3,00	1,35	1,21	1,48	<0,01
1995-1996	122 776	546	4,45	629 006	1 932	3,07	1,45	1,31	1,59	<0,01
1996-1997	122 218	530	4,34	630 777	1 962	3,11	1,39	1,26	1,53	<0,01
1997-1998	121 882	522	4,28	632 355	2 155	3,41	1,26	1,14	1,38	<0,01
1998-1999	120 923	561	4,64	632 498	2 382	3,77	1,23	1,12	1,35	<0,01
1999-2000	119 916	622	5,19	634 432	2 436	3,84	1,35	1,23	1,47	<0,01
2000-2001	119 286	619	5,19	637 312	2 584	4,05	1,28	1,17	1,39	<0,01
2001-2002	112 530	556	4,94	615 105	2 479	4,03	1,23	1,11	1,34	<0,01
Total	1 582 230	7 138	4,51	8 144 216	27 758	3,41	1,32	1,29	1,36	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 53 : Diagnostics-congés des hôpitaux indiquant comme cause principale une maladie de la peau ou des tissus sous-cutanés (CIM-9 : 680 à 709) dans les régions de la santé 5 et 6 (RS 5 et 6) et chez la population-type du Nouveau-Brunswick, par exercice financier, de 1989-1990 à 2001-2002

Exercice financier	Régions de la santé 5 et 6			Population-type du Nouveau-Brunswick			Ratio des taux	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
	Population	Total	Taux*	Population	Total	Taux*				
1989-1990	123 472	485	3,93	614 522	2 263	3,68	1,07	0,96	1,17	0,21
1990-1991	123 766	530	4,28	619 189	2 280	3,68	1,16	1,05	1,27	<0,01
1991-1992	124 062	572	4,61	621 484	2 083	3,35	1,38	1,25	1,50	<0,01
1992-1993	124 043	536	4,32	624 420	2 086	3,34	1,29	1,17	1,42	<0,01
1993-1994	123 953	509	4,11	625 577	1 924	3,08	1,34	1,20	1,47	<0,01
1994-1995	123 403	492	3,99	627 539	2 125	3,39	1,18	1,06	1,29	<0,01
1995-1996	122 776	489	3,98	629 006	2 137	3,40	1,17	1,06	1,29	<0,01
1996-1997	122 218	509	4,16	630 777	1 965	3,12	1,34	1,21	1,47	<0,01
1997-1998	121 882	455	3,73	632 355	2 107	3,33	1,12	1,01	1,23	0,03
1998-1999	120 923	434	3,59	632 498	2 098	3,32	1,08	0,97	1,19	0,14
1999-2000	119 916	351	2,93	634 432	2 010	3,17	0,92	0,82	1,03	0,16
2000-2001	119 286	364	3,05	637 312	1 685	2,64	1,15	1,02	1,28	0,01
2001-2002	112 530	355	3,15	615 105	1 567	2,55	1,24	1,10	1,38	<0,01
Total	1 582 230	6 081	3,84	8 144 216	26 330	3,23	1,19	1,16	1,22	<0,01

Remarque : *Taux bruts par 1000 habitants. Il s'agit de la population des années de recensement (1991, 1996, 2001); sinon, il s'agit d'estimations intercensitaires obtenues de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick. LCI/LCS – limites de confiance inférieures/supérieures.

Tableau 54 : Ratio standardisé de morbidité (RSM) dans le cas de certains diagnostics-congés selon la cause principale, dans les régions de la santé 5 et 6, de 1989-1990 à 2001-2002

Catégorie de maladie (CIM-9)	Observé	Prévu	RSM	LCI de 95 %	LCS de 95 %	Valeur *p*
Maladie de l'appareil respiratoire (CIM-9 : 460 à 519)	38 867	27 832,95	1,40	1,38	1,41	<0,01
Maladie de l'appareil circulatoire (CIM-9 : 390 à 459)	37 145	33 484,66	1,11	1,10	1,12	<0,01
Maladie de l'appareil digestif (CIM-9 : 520 à 579)	49 948	42 069,87	1,19	1,18	1,20	<0,01
Maladie de l'appareil génito-urinaire (CIM-9 : 580 à 629)	37 033	36 417,13	1,02	1,01	1,03	<0,01
Troubles endocriniens, nutritionnels et métaboliques (CIM-9 : 240 à 279)	7 138	5 260,78	1,36	1,33	1,39	<0,01
Peau et tissus sous-cutanés (CIM-9 : 680 à 709)	6 081	5 075,38	1,20	1,17	1,23	<0,01
Toutes les causes	351 107	339 068,37	1,04	1,03	1,04	<0,01

ETUDE SUR LA SANTE DANS LA REGION DE

Belledune

AREA HEALTH STUDY

Belle-Eau • Petit Rocher • Pointe-Verte